

BRUCIORE GASTROESOFAGEO, EPIGASTRALGIA, DISPEPSIA

RAZIONE CONSIGLIATA E MODALITÀ D'ASSUNZIONE NELL'ADULTO

- Per contrastare i sintomi bruciore e mal di stomaco, sia a stomaco vuoto, sia a stomaco pieno: una - due compresse, una per volta, al bisogno.
- Per favorire un'azione epitelio-riparativa e di potenziamento dei fattori di resistenza epiteliale (esofagite): una compressa 3 - 5 volte al giorno lontano dai pasti.

RAZIONE CONSIGLIATA E MODALITÀ D'ASSUNZIONE NELL'INFANZIA

- Secondo il parere del Medico pediatra.

Sciogliere le compresse lentamente nel cavo orale, per una veicolazione salivare del composto e per favorirne la stratificazione epiteliale.

Senza zucchero, senza edulcoranti.



A 900200496

COLOSTRO, ESTRATTO DI LIQUIRIZIA e PSYLLIUM
come matrice polisaccaridica di trasporto a funzione di film-barriera

SCHEDA TECNICA

DENOMINAZIONE DI VENDITA



L'ANTIACIDO SENZA ALLUMINIO

INGREDIENTI FUNZIONALI ATTIVI

(contenuto per ciascuna razione - compressa)

- mg 270 circa di colostro bovino liofilizzato;
- mg 330 di estratto secco di liquirizia standardizzato in glicirizina;
- psillio fibra come agente polisaccaridico di trasporto a funzione di film-barriera e lenitiva.

FORMATO E PREZZO AL PUBBLICO

Astuccio da 24 dosi (comprese)	€ 10,00
--------------------------------	---------

VANTAGGI PROCURATI DALL'INTEGRAZIONE ALIMENTARE COL PRODOTTO

Colostro:

- favorisce la riepitelizzazione della mucosa gastroesofagea e ne potenzia i fattori di resistenza, grazie ai componenti trofici e di difesa antibatterici (fattori di crescita, lattoferrina, lisozima, citokine, molecole ad azione immunostimolante);
- contribuisce a mantenere l'integrità della mucosa gastroesofagea, contrastando molteplici noxe patologiche (miceti, batteri, insulto acido-alcalino, farmaci responsabili di danni gastrolesivi).

Liquirizia:

- stimola la secrezione di muco, ne aumenta la viscosità esercita azione antiflogistica, spasmolitica ed antivirale. La glicirizina viene metabolizzata ad acido glicirretico che, con meccanismo di inibizione enzimatica, favorisce la concentrazione di prostanoidi, sostanze citoprotettive utili in caso di ulcera e gastrite.

Psyllium:

- agente polisaccaridico di trasporto a funzione di FILM-BARRIERA, avente anche azione lenitiva.

CONDIZIONI PER LE QUALI NE E' CONSIGLIATA L'INTEGRAZIONE ALIMENTARE

Gastromilk è una formulazione ad azione ANTIACIDA e PROTETTIVA, NON CONTENENTE ALLUMINIO, attiva verso i sintomi bruciore e "mal di stomaco" (pirosi ed epigastria). Può essere considerato anche un adiuvante alimentare nella gestione delle patologie acido correlate, combinabile con la terapia antisecretiva. Agisce "filmando" e proteggendo la mucosa gastroesofagea; grazie all'azione eutrofica e antinfettiva dei suoi componenti, favorisce l'epitelio-riparazione ed il potenziamento dei fattori di resistenza epiteliale. **Ogni compressa deve essere disciolta lentamente nel cavo orale, per favorire la veicolazione salivare del composto e la sua adesione-interazione con epitelio gastroesofageo.**

Indicazioni come complemento alimentare

- malattia da reflusso gastroesofageo per il controllo sintomatico del bruciore; combinabile con la terapia farmacologica antisecretiva; esofago irritabile;
- dispepsia a sintomatologia simil-ulcerosa, anche *Helicobacter pylori* correlata e/o persistente dopo la terapia antibiotica eradicativa;
- gastrite e gastroduodenite da disordini alimentari, degli alcolisti, dei nefropatici, degli epatopatici;

- gastrite ed esofagite alcalina; combinabile cogli agenti di barriera meccanici come il sodio alginato;
- gastropatia da FANS e iatrogena in genere;
- mucositi da chemioterapia, da radioterapia, infettive;
- postumi di gastroresezione e di by pass gastro-digiuno-ileali;
- lesioni ulcerative del cavo orale (afte, stomatiti, ecc).

Informazioni nutrizionali per 1 compressa

VALORE ENERGETICO	Kcal 3,5/KJ 14,8
UNITÀ DI MISURA	grammi
PROTEINE	0,16
CARBOIDRATI	0,69
GRASSI	0,07
FIBRA ALIMENTARE	0,46
SODIO	0,02

Persona diabetica: ammesso.

Persona celiaca: i lotti di prodotto finora analizzati sono risultati negativi al glutine (<10ppm).

GRAVIDANZA, ALLATTAMENTO

si consiglia di non superare la razione di 100 mg di glicirizina al giorno (5 compresse circa).

IPERTENSIONE

nelle persone ipertese si consiglia di non superare la razione di 100 mg di glicirizina al giorno (5 compresse circa).

CONTROINDICAZIONI

non esistono controindicazioni se si rispettano le razioni giornaliere consigliate, salvo intolleranze particolarmente gravi al latte vaccino. Dato il contenuto in glicirizina il prodotto può risultare controindicato nei pazienti con grave ipertensione, cirrosi, ritenzione idrica, iperaldosteronismo primario e secondario.

INTERAZIONI

a causa della composizione chimica della liquirizia sono ipotizzabili le seguenti interazioni: potenziamento dell'azione dell'idrocortisone a livello della pelle e dei polmoni; aumento della concentrazione plasmatica di prednisolone; sinergia con l'insulina; aumento della biodisponibilità della nitrofurantoina. Evitare l'utilizzo con preparazioni a base di digitale.

QUALITÀ

- Prodotto notificato al Ministero della Salute italiano fabbricato in stabilimento autorizzato dal Ministero della Salute italiano e secondo norme di fabbricazione GMP.
- La fibra di psyllium utilizzata ha una purezza certificata non inferiore al 99%.
- Assenza certificata di contaminanti chimici da trattamenti di riduzione della carica microbica delle materie prime impiegate
- Il colostro utilizzato è degrassato, decaseinato, titolato e standardizzato in immunoglobuline e fattori di crescita.

CATEGORIA NORMATIVA

integratore alimentare notificato al Ministero della Salute.