

DIARREA, INCONTINENZA

RAZIONE CONSIGLIATA E MODALITÀ D'ASSUNZIONE NELL'ADULTO

La quantità di Stopper da assumere giornalmente è molto variabile e dipende dalle condizioni individuali del Paziente e dal parere del Medico. Indicativamente:

- **nella diarrea acuta:** 1-2 bustine dopo ogni scarica.
- **nell'incontinenza fecale e nella diarrea cronica:** da 1 a 3 bustine al giorno, iniziando con 1 bustina ed aumentando la razione con gradualità per prevenire uno squilibrato aumento nella consistenza fecale.

Ciascuna bustina deve essere disciolta in 50 – 80 ml d'acqua, circa un terzo del contenuto di un bicchiere da bibita.

RAZIONE CONSIGLIATA E MODALITÀ D'ASSUNZIONE NELL'INFANZIA:

Secondo il parere del Medico pediatra.



A 902994817

SILICATO IDRATO D'ALLUMINIO

SCHEDA TECNICA

DENOMINAZIONE DI VENDITA



ADDENSANTE FECALE, DETOSSIFICANTE INTESTINALE

INGREDIENTI FUNZIONALI ATTIVI

(contenuto per ciascuna razione-bustina)

- Silicato Idrato di Alluminio (argilla bianca naturale o caolino) g 5,5.

FORMATO E PREZZO AL PUBBLICO

Astuccio da 20 dosi (bustine)

€ 9,80

GUSTO Arancia.

VANTAGGI PROCURATI DALL'INTEGRAZIONE ALIMENTARE COL PRODOTTO

- Aumento nella consistenza fecale.
- Neutralizzazione, per adsorbimento, di microrganismi, endotossine, alimenti, farmaci, sali biliari, cataboliti contaminanti e materiali di scarto, coinvolti nell'eziologia del sintomo diarroico.
- Stratificazione filmante - protettiva della mucosa intestinale.

VANTAGGI PROCURATI DALL'INTEGRAZIONE ALIMENTARE COL PRODOTTO

- Diarrea acuta tossinfettiva (virale, batterica), diarrea del viaggiatore.
- Diarrea cronica: da colon irritabile, da malattia infiammatoria cronica intestinale, da farmaci.
- Sindrome da malassorbimento.
- Diarrea associata a chemioterapia e a radioterapia.
- Sindrome da intestino corto: diarrea/incontinenza secondarie a chirurgia colonrettale e bariatrica (anastomosi intestinali, ileoanoanastomosi, anastomosi coloanale con deficit della continenza).
- Incontinenza fecale di grado lieve e moderato da sindrome del pavimento pelvico.

GRAVIDANZA, ALLATTAMENTO

Il prodotto non viene assorbito ed è da considerarsi generalmente sicuro. Si segnala la presenza di sucralosio, un edulcorante ricavato dallo zucchero (saccarosio).

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Valore energetico	Kcal 4,9 /kJ 20,9
Unità di misura	grammi
Proteine	0,12
Carboidrati	0,62
Grassi	0,21

Persona diabetica: ammesso.

Persona celiaca: i lotti di prodotto finora analizzati sono risultati negativi al glutine (<10ppm).

INTERAZIONI

Glicosidi cardiaci, alcaloidi, estrogeni, cloroquina, clindamicina, digossina, lincomicina.

AVVERTENZE

- Assumere il prodotto almeno 2 ore prima o due ore dopo i farmaci, in particolare in corso di terapia coi farmaci sopracitati.
- Se il sintomo non regredisce consultare il Medico.

EFFETTI COLLATERALI

Stipsi.

CONTROINDICAZIONI

- Ipersensibilità verso il caolino.
- Diarrea secondaria ad enterocolite pseudomembranosa ed in generale a gravi patologie organiche a carico del tubo gastroenterico.

QUALITÀ

- Il caolino utilizzato è stato purificato da ossido di ferro, carbonato di calcio, carbonato di magnesio ed altre impurità mediante eluizione e vanta gli standards previsti dalla Farmacopea Britannica e dell'Unione Europea.
- L'utilizzo di caolino nel trattamento sintomatico della diarrea-sintomo è approvato e ritenuto efficace dalla U.S. FDA e fa parte della consolidata prassi clinica.
- Dosaggi e posologia sono equivalenti a quelli dichiarati sicuri ed efficaci dalla predetta autorità e ricalcano quelli dei più utilizzati formulati americani e britannici.

CATEGORIA NORMATIVA

Integratore alimentare notificato al Ministero della Salute.